



ИНСТРУКЦИЯ
по применению Винилина (Бальзама Шостаковского) для лечения ран различного происхождения, эндометритов и маститов у животных
(Организация-разработчик: ООО Фирма «БиоХимФарм», Владимирская обл., г. Радужный)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Винилин.
Международное непатентованное наименование: поливиннокс (Polyvinox).
2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.
Винилин в качестве действующего вещества в 1 мл содержит поливиннокс (поливинил-бутиловый эфир)-500 мг и вспомогательные вещества.
По внешнему виду препарат представляет собой густую вязкую жидкость светло-желтого цвета со специфическим запахом.
3. Винилин выпускают расфасованным в аэрозольные баллоны 100 мл, 170 мл, по 100 мл в стеклянных или полимерных флаконах, укупоренных резиновыми пробками, укрепленными резиновыми колпачками, или расфасованным по 1 л и 10 л в полимерных ведрах соответствующей вместимости, укупоренных герметизирующими крышками с замком для контроля первого вскрытия.
4. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя при температуре от 5 °С до 25 °С.
5. Срок годности при соблюдении условий хранения – 5 лет с даты производства.
Запрещается применение Винилина по истечении срока годности.
6. Винилин следует хранить в местах, недоступных для детей.
7. Неиспользованный препарат с истекшим сроком годности утилизируют в соответствии с законодательством.

II. Фармакологические свойства

8. Винилин обладает противовоспалительным, антисептическим, анестезирующим действием. Способствует очищению ран, регенерации тканей и эпителизации.
9. Препарат безвреден, не оказывает токсического действия на клетки и ткани организма. Действие его основано на способности изменять иммунобиологические свойства тканей, повышая их защитную реакцию.
10. Лекарственный препарат по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

11. Винилин применяют наружно для лечения ран различного происхождения (в том числе гнойных), ожогов, отморожений, трофических язв, воспалительных заболеваний кожи, дерматитов, маститов, эндометритов.
12. Противопоказанием к применению является индивидуальная повышенная чувствительность животного к препарату.
13. Препарат применяют наружно. Перед применением подогревают до 39°С-40°С.
14. Препарат применяют в чистом виде и как масляный раствор 20%, в том числе в соединении с прочими совместимыми с препаратом средствами – пастами, кремами, мазями.
15. Для лечения ран, кожных заболеваний и других хирургических патологий винилин наносят непосредственно на пораженный участок один раз в день с интервалом 1—2 дня до выздоровления. С целью повышения эффективности действия препарата используется смоченная Винилином марлевая салфетка, которая накладывается на пораженный участок и закрепляется повязкой.
16. При лечении ран, представляющих собой значительную полость, Винилин наливается непосредственно в рану и туда же вводится марлевый тампон, а сверху наносится асептическая повязка.

повязка. Повторные перевязки производят 1 раз в 3-5 дней до выздоровления. Количество Винилина, используемого на одну обработку, зависит от характера поражения и размера пораженного участка.

Для лечения маститов перед применением Винилина содержимое больной четверти вымени выдаивают в отдельную посуду, сосок дезинфицируют 70%-ным спиртом.

Для введения препарата снимают с клапанного устройства аэрозольного баллона колпачок, надевают коническую насадку и вводят в сосковый канал. Легкое нажатие на клапанное устройство в течение 2-3 секунд обеспечивает поступление в четверть вымени необходимой дозы препарата.

Лактирующим коровам с клинической формой мастита Винилин вводят 2 раза в сутки с интервалом в 10-12 часов до выздоровления.

При субклиническом мастите Винилин применяют 1 раз в день в течение 3-х суток.

Сухостойным коровам, больным маститом, Винилин вводят трехкратно с интервалом между введениями 3-4 дня.

Расфасованный во флаконы и канистры препарат вводят по той же схеме и аналогично описанному выше способу с помощью шприца и катетера в дозе из расчета 10 мл на пораженную долю вымени.

Для лечения серозно-катарального и катарального мастита, а также трещин сосков вымени у коров 3—5 мл винилина наносят наружно на пораженную долю в течение 5 минут после сдаивания, втирают его, сочетая с массажем вымени.

Для лечения эндометритов препарат вводят в следующих дозах:

-коровам, кобылам, верблюдицам – по 50-55 мл, что обеспечивается впрыскиванием препарата из баллона в течение 28-32 секунд;

-свиноматкам, овцематкам и козам – по 25-30 мл, для чего препарат выпрыскивается в течение 14-16 секунд.

Перед внутриматочным введением Винилина проводят санитарную обработку наружных половых органов и корня хвоста. При необходимости освобождают полость матки от воспалительного экссудата.

Для введения препарата на аэрозольный баллон надевают распылительную головку с катетером, захватывают шейку матки рукой, введенной через прямую кишку, осторожно вводят катетер через шейку в полость матки и, держа аэрозольный баллон вертикально, вводят содержимое баллона.

Препарат вводят с интервалом в 48 часов 2-4 раза, в зависимости от тяжести течения болезни.

Расфасованный во флаконы и канистры Винилин вводят в полость матки с помощью шприца Жане и катетера в количестве 150-200 мл 3—4 раза с интервалом 2 дня.

11. Симптомов передозировки при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не установлено.

12. Особенности действия препарата при начале применения или при его отмене не выявлено.

13. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата (обработки), так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной или нескольких доз применение препарата как можно раньше возобновляют в той же дозировке и по той же схеме.

14. Побочных явлений и осложнений при применении Винилина в соответствии с настоящей инструкцией не установлено.

15. Применение Винилина не исключает использования других лекарственных средств.

16. Молоко при наружном и внутриматочном применении препарата используют в пищу без ограничений. При лечении маститов молоко из здоровых четвертей вымени используют в пищу без ограничений, а из больных — после полного исчезновения клинических признаков мастита, подтвержденного маститными тестами.

Мясо убойных животных при применении препарата используется без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с Винилином следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

18. При работе с лекарственным препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу.

После работы с лекарственным препаратом следует вымыть руки с мылом. Запрещается использование пустой тары из-под лекарственного препарата для бытовых целей.

19. При попадании Винилина на кожу, ее следует протереть салфеткой, смоченной в растительном масле или другом нетоксичном органическом растворителе и промыть водой с мылом. Слизистые оболочки при попадании на них препарата необходимо промыть струей чистой воды. При необходимости следует обратиться к врачу (при себе иметь этикетку или инструкцию по применению препарата).