

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «АПИ-САН»


А.А. Смирнов
«27»  2019 г.



ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата Санофлай®

(организация-разработчик: ООО «АПИ-САН», 117437, г. Москва,
ул. Ак. Арцимовича, д. 3, корп. 1, кв. 222)

Номер регистрационного удостоверения: PK - ВП - 5 - 4039 - 19

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:
торговое наименование: Санофлай® (Sanofly);
международное непатентованное наименование: цифлутрин.
2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения. Пур-он.
Санофлай® в качестве действующего вещества в 1 мл содержит 10 мг цифлутрина,
а также вспомогательные вещества: октилдодеканол, сольвент нефтяной с высоким
содержанием ароматики, вазелиновое масло.
3. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную жидкость от
бесцветного до светло-желтого цвета.
Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения –
2 года со дня производства.
Запрещается применение препарата Санофлай® по истечении срока годности.
4. Санофлай® расфасовывают по 10 мл в полимерные флаконы-капельницы в
комплекте с крышками навинчиваемыми и пробками-капельницами; по 100 мл в
полимерные флаконы с навинчиваемыми крышками; по 500 мл и 1 л в полимерные
флаконы с двумя горловинами и дозирующим устройством. Флаконы по 10 мл
упаковывают поштучно в картонные пачки. Флаконы по 100, 500 мл и 1 л упаковывают в
транспортную тару. Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по
применению.
5. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых
солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 8°C
до 25°C.
6. Санофлай® следует хранить в местах недоступных для детей.
7. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями
законодательства.
8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Санофлай® относится к инсектоакарицидным лекарственным препаратам из
группы синтетических пиретроидов.
10. Санофлай® обладает контактным инсектицидным и репеллентным действием в
отношении двукрылых насекомых: зоофильных мух, включая *Haematobia irritans*,

Haematobia stimulans, *Musca autumnalis*, *Stomoxys calcitrans*, слепней (*Tabanidae*), оводов (*Hypodermatidae*), комаров (*Culicidae*), мошек (*Simuliidae*).

Действующим веществом препарата является цифлутрин, который относится к группе синтетических пиретроидов, механизм действия которых заключается в блокировании передачи нервных импульсов, что вызывает нарушение координации движений, паралич и гибель насекомых.

После нанесения на кожу препарат распределяется по поверхности тела, в незначительной степени резорбируется кожей, что обеспечивает его длительное инсектоакарицидное и репеллентное действие.

Санофлай® по степени воздействия на организм относится к мало опасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). В рекомендуемой дозе препарат не оказывает резорбтивно-токсического, эмбриотоксического, тератогенного, мутагенного, иммунотоксического и местнораздражающего действия на кожу. При попадании на слизистые оболочки глаз вызывает слабое раздражение.

III. Порядок применения

11. Санофлай® применяют для обработки крупного и мелкого рогатого скота в пастбищный период, лошадей в период активного лета насекомых, в целях уничтожения зоофильных мух, слепней, оводов, комаров, мошек и защиты животных от их нападения. Защитное действие препарата продолжается не менее 28 дней после однократной обработки.

12. Санофлай® не следует наносить на влажную, поврежденную и загрязненную кожу.

13. При работе с препаратом Санофлай® следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их следует немедленно промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом Санофлай®. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека, следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

14. Не следует применять препарат самкам в первой половине беременности. Применение препарата самкам в период беременности возможно после консультации с ветеринарным врачом.

15. Крупному и мелкому рогатому скоту, лошадям массой менее 300 кг Санофлай® наносят на кожу спины вдоль позвоночника от холки до крестца в дозе 0,3 мл на 10 кг массы животного. Крупному рогатому скоту и лошадям массой более 300 кг Санофлай® наносят на кожу спины вдоль позвоночника от холки до крестца в дозе 10 мл на животное. Обработку животных проводят в пастбищный период, желательно в вечернее время суток, один раз в 4-6 недель, в зависимости от численности насекомых. Дойных животных следует обрабатывать сразу после вечерней дойки.

Перед массовой обработкой поголовья каждую серию препарата Санофлай® следует испытать на небольшой группе животных. При отсутствии осложнений в течение суток приступают к обработке всего поголовья.

16. При применении препарата Санофлай® в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается.

При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны: угнетение, повышенная возбудимость, гиперемия и болезненность в месте обработки. При появлении аллергических реакций применение препарата прекращают и назначают животному антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

17. При передозировке у животных возможны: угнетение и самопроходящая гиперсаливация. При локализованном применении препарата возможны ожоги.

18. Взаимодействие с другими лекарственными препаратами: не рекомендуется применение препарата с другими синтетическими пиретроидами.

19. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не выявлено. При первом применении в редких случаях возможна гиперсаливация, проходящая самостоятельно без применения лекарственных средств.

20. В случае пропуска очередной обработки применение препарата возобновляют в той же дозе и по той же схеме.

21. Продукцию животноводства после применения препарата Санофлай® в соответствии с настоящей инструкцией разрешается использовать в пищевых целях без ограничений.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

ООО «Апиценна», Московская область, г. Балашиха, Полтевское шоссе, владение 4.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ООО «Апиценна», Московская область, г. Балашиха, Полтевское шоссе, владение 4.

Генеральный директор
ООО «АПИ-САН»



А.А.Смирнов