

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата Габивит-Se® для профилактики и лечения гиповитаминозов, нарушений минерального обмена, заболеваний сельскохозяйственных животных и собак, вызванных недостатком селена

(Организация-разработчик: ООО «НИК «Асконт+», 142279, Московская область, Серпуховский район, рп. Оболенск, ул. Строителей, строение 2)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Габивит-Se* (Gabivit-Se).
Международное непатентованное наименование: ретинол, колекальциферол, альфа-токоферола ацетат, тиамин, рибофлавин, пиридоксин, цианокобаламин, никотинамид, пантотеновая кислота, инозитол, холина цитрат, меди сульфат, цинка сульфат, марганца сульфат, натрия селенит, гидролизат белка лактоальбумина

2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.

Габивит-Be⁸¹ в качестве действующих веществ в 1 мл содержит: витамин А - 50 000 МЕ, витамин Дз - 25 000 МЕ, витамин Е - 4 мг, витамин В] — 10 мг, витамин Вг - 0,04 мг, витамин Вб - 2 мг, витамин В12 - 0,01 мг, никотинамид -5 мг, пантотеновая кислота - 2 мг, инозитол - 2 мг, холина цитрат - 5 мг, кобальта хлорид - 0,02 мг, сульфат меди - 0,1 мг, сульфат цинка - 0,1 мг, сульфат марганца - 0,06 мг, селенит натрия (в пересчете на селен) - 0,15 мг, гидролизат белка лактоальбумина - 5 мг, в качестве вспомогательных веществ: нипагин и воду для инъекций.

3. Лекарственный препарат представляет собой опалесцирующую жидкость от светло-желтого до светло-коричневого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения - 1 год с даты производства, после вскрытия флакона - 10 суток.

Запрещается применение препарата Габивит-Se® по истечении срока годности.

4. Выпускают лекарственный препарат расфасованным по 10, 15, 25, 30, 50 и 100 мл в темные стеклянные флаконы, по 400 и 500 мл в темные стеклянные бутылки соответствующей вместимости. Флаконы укупоривают резиновыми пробками и обкатывают алюминиевыми колпачками. Флаконы по 10 мл помещают в картонную коробку по 50 штук. Каждую потребительскую упаковку препарата снабжают инструкцией по применению.

5. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 5 до 25 °С.
6. Габивит-Se[™] следует хранить в местах, недоступных для детей.
7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Фармакотерапевтическая группа лекарственного препарата: витамины в комбинации с другими препаратами.
10. Входящие в состав лекарственного препарата витамины участвуют в метаболизме в качестве катализаторов и необходимы для обеспечения нормальной жизнедеятельности организма животного. Микроэлементы активизируют работу ферментной системы организма. Селен предотвращает развитие беломышечной болезни молодняка, обладает антиоксидантными свойствами. Селен и витамин Е препятствуют накоплению токсических продуктов перекисного окисления липидов, повышают иммунитет животных.

Габивит-Se[™] по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает местно-раздражающего, сенсибилизирующего, эмбриотоксического, тератогенного, мутагенного и канцерогенного действия, не обладает кумулятивными свойствами.

III. Порядок применения

11. Габивит-Se[™] назначают для лечения и профилактики гиповитаминозов, нарушений минерального обмена и заболеваний сельскохозяйственных животных и собак, вызванных недостатком селена.

12. Противопоказанием к применению препарата Габивита-Se[®] является повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, а также избыточное содержание селена и витаминов в рационе животных.

13. Габивит-Se[®] вводят внутримышечно в область бедра или шеи, смещая кожу в месте укола во избежание вытекания раствора. В зимнее время перед применением препарат следует подогреть на водяной бане до 25 °С. При назначении препарата с профилактической целью необходимо учитывать содержание селена и витаминов в кормах, входящих в состав рациона животных.

С профилактической целью (при стрессах, в период интенсивных нагрузок, высокой продуктивности, беременным животным, при нарушениях воспроизводительной функции, отставании молодняка в росте и развитии, в период вакцинации, дегельминтизации, выздоровления после перенесенных заболеваний) препарат вводят однократно, в дозах, указанных в таблице. С лечебной целью - в тех же дозах двукратно с интервалом в 7 суток.

Вид животного	Возрастная и технологическая группа	Суточная доза, (мл на животное)
Крупный рогатый скот	взрослое поголовье	15-20
	молодняк (6 - 12-месячного возраста)	10- 15
	телята до 6-месячного возраста	8
Свиньи	супоросные, лактирующие свиноматки и хряки	10- 15
	свиньи на откорме	5
	ремонтный молодняк	8
	поросята-отъемыши	2 - 3
	поросята-сосуны	2
Овцы, козы	взрослое поголовье	8
	молодняк	5
	ягнята, козлята	2
Собаки	живая масса до 10 кг	0,5
	живая масса от 10 кг до 30 кг	1
	живая масса свыше 30 кг	3

При необходимости курс лечения повторяют через 1 - 2 месяца.

14. Симптомов, возникающих при передозировке препарата, у животных не установлено.

15. Особенности действия лекарственного препарата при первом применении или при его отмене не выявлено.

16. Особенности применения у беременных животных, у животных в период лактации, у потомства животных не выявлено.

17. При пропуске приема одной или нескольких доз лекарственного препарата его применение возобновляют по той же схеме в соответствии с настоящей инструкцией. Не следует вводить двойную дозу для компенсации пропущенной.

18. При применении препарата Габивит-Se® согласно настоящей инструкции побочных явлений и осложнений у животных не выявлено. В месте инъекции препарата может наблюдаться изменение окраски кожи, самопроизвольно исчезающее в течение 10 - 14 суток. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают антигистаминные средства и, при необходимости, симптоматическое лечение.

19. Габивит-Se® совместим с другими лекарственными средствами и кормовыми добавками, применяемыми в животноводстве.

20. Убой животных на мясо разрешается для свиней и мелкого рогатого скота не ранее, чем через 14 суток, а для крупного рогатого скота - не ранее, чем через 30 суток после применения лекарственного препарата. Мясо животных, вынужденно убитых ранее установленных сроков, может быть использовано в корм пушным зверям.

Молоко животных во время и после применения препарата разрешается использовать в пищевых целях без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. При

работе с препаратом запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

22. При случайном контакте препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам лекарственного препарата следует избегать прямого контакта с Габивит-Se®. Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

23. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека, следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

Наименования и адреса производственных площадок производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения

ООО «НПК «Асконт+», 142279, Московская область, Серпуховский р-н, рп. Оболенск, ул. Строителей, строение 2

Наименование, адрес организации, уполномоченной владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя

ООО «НПК «Асконт+», 142279, Московская область, Серпуховский р-н, рп. Оболенск, ул. Строителей, строение 2

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению препарата Габивит-Se®, утвержденная Россельхознадзором 04 октября 2013 года.

Номер регистрационного удостоверения 32.-3 ¹ -3 ' 33 94 V/7&p-j - fr/z^y