

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата Кайод таблетки
для профилактики и лечения заболеваний, вызванных йодной недостаточностью у
крупного рогатого скота

(Организация-разработчик: ООО «НПК «Асконт+», Московская область)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Кайод таблетки.

Международное непатентованное наименование: калия йодид.

2. Лекарственная форма: таблетки для перорального применения.

Кайод таблетки массой 0,1 г содержат в 1 таблетке в качестве действующего вещества калия йодид – 3,0 мг, а в качестве вспомогательных веществ: магния карбонат – 2,2 мг; магний сернокислый – 2,0 мг; натрия тиосульфат – 1,5 мг; кальция стеарат – 1,0 мг; тальк – 3,0 мг; лактозу – 87,3 мг.

Кайод таблетки массой 0,2 г содержат в 1 таблетке в качестве действующего вещества калия йодид – 6,0 мг, а в качестве вспомогательных веществ: магния карбонат – 4,4 мг; магний сернокислый – 4,0 мг; натрия тиосульфат – 3,0 мг; кальция стеарат – 2,0 мг; тальк – 6,0 мг; лактозу – 174,6 мг.

По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой таблетки белого цвета, круглой формы.

3. Кайод таблетки расфасованы по 10, 50, 100, 250, 500, 1000, 2500 и 5000 штук в пакеты из пленки полиэтиленовой и упакованы в банки из полипропилена, укупоренные крышками с уплотняющим элементом из полиэтилена высокого давления.

4. Кайод таблетки хранят в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5 °C до 25 °C.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 2 года с даты производства. Запрещается применение лекарственного препарата по истечении срока годности.

5. Кайод таблетки следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Кайод таблетки относятся к препаратам йода для профилактики и лечения заболеваний щитовидной железы.

Йод участвует в обмене веществ как составляющая часть гормона щитовидной железы, способствует ферментообразованию, активизирует защитные реакции организма. Калия йодид, восполняя дефицит йода в организме, благоприятно влияет на рост и развитие молодняка, способствует повышению продуктивности и сохранности животных. Не содержит свободного йода и поэтому не оказывает раздражающего

действия на слизистую оболочку. В желудочно-кишечном тракте быстро всасывается и проникает в органы и ткани.

По степени воздействия на организм Кайод таблетки относятся к веществам малоопасным (согласно ГОСТ 12.1.007, 4 класс опасности).

III. Порядок применения

8. Кайод таблетки назначают с лечебной и профилактической целью крупному рогатому скоту при энзоотическом зобе и других заболеваниях, развивающихся на фоне йодной недостаточности, а также в зонах с дефицитом йода в почве и кормах.

9. Противопоказанием к применению Кайод таблеток является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата.

10. Кайод таблетки с профилактической целью применяют индивидуально перорально ежедневно в дозах, указанных в таблице:

| Вид животного | Количество таблеток на 1 животное, шт | |
|---|---------------------------------------|-------------------|
| | таблетки по 0,1 г | таблетки по 0,2 г |
| Молодняк крупного рогатого скота на откорме массой до 300 кг | 1 | 0,5 |
| Молодняк крупного рогатого скота на откорме массой более 300 кг | 2 | 1 |
| Взрослое поголовье на откорме из расчета | 3 – 4 | 1,5 – 2 |
| Быки-производители из расчета на каждые 200 кг массы животного; | 1 | 0,5 |
| Нетели | 1 – 2 | 0,5 – 1 |
| Первотелки | 2 – 3 | 1 – 1,5 |

Кайод таблетки применяют дойным коровам в зависимости от удоя и периода лактации в дозах, указанных в таблице:

| Годовой удой, л | Таблеток на голову в сутки, шт | | | |
|--------------------|------------------------------------|----------------------|--|----------------------|
| | С 3-го месяца лактации до сухостоя | | В период сухостоя, 1 и 2 месяца лактации | |
| | таблетки по 0,1 г | таблетки по 0,2 г | таблетки по 0,1 г | таблетки по 0,2 г |
| 2000 - 3000 | 1 – 2 | 0,5 – 1 | 2 – 3 | 1 – 1,5 |
| 3000 - 4000 | 2 – 3 | 1 – 1,5 | 3 – 4 | 1,5 – 2 |
| 4000 - 5000 | 3 – 4 | 1,5 – 2 | 4 – 5 | 2 – 2,5 |
| 5000 - 6000 | 4 – 5 | 2 – 2,5 | 5 – 6 | 2,5 – 3 |

Препарат с лечебной целью применяют по показаниям в тех же дозах ежедневно, до исчезновения клинических признаков заболевания.

11. Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата в соответствии с инструкцией не выявлены.
12. Особеностей действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не установлено.
13. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозировке и по той же схеме.
14. При применении препарата Кайдод таблетки в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается.
15. Препарат совместим с другими лекарственными средствами и кормовыми добавками.
16. Продукцию животноводства во время и после применения препарата можно использовать в пищевых целях без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с Кайдод таблетками следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Во время работы с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу.
18. Людям с гиперчувствительностью к йоду следует избегать прямого контакта с препаратом. При случайном попадании препарата на кожу или слизистые оболочки его необходимо смыть проточной водой с мылом. В случае появления аллергических реакций и/или случайном проглатывании лекарственного препарата следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).
19. Пустую тару, из-под лекарственного препарата, запрещается использовать для бытовых целей; она подлежит утилизации с бытовыми отходами.
20. Организация-производитель: ООО «НПК «Асконт+», 142279, Московская область, Серпуховский р-н, пгт Оболенск, корпус 2 ВЛГ

Инструкция разработана ООО «НПК «Асконт+», 142279, Московская область, Серпуховский р-н, пгт Оболенск, корпус 2 ВЛГ.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Кайдод таблетки, утвержденная Россельхознадзором 28 января 2009 года.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Номер регистрационного удостоверения