

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Сульф 120 и Сульф 480 для лечения болезней
бактериальной этиологии у животных

(Организация-разработчик ООО “НВЦ Агроветзащита”, г. Москва)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Сульф 120, Сульф 480 (Sulfum 120; Sulfum 480).

Международное непатентованное название: сульфадиазин, триметоприм.

2. Лекарственная форма: таблетки для орального применения.

Сульф 120 в 1 таблетке содержит в качестве действующих веществ сульфадиазин - 0,1 г и триметоприм - 0,02 г, а также вспомогательные вещества: крахмал картофельный - 0,05 г, кальция стеарат - 0,003 г и лактозу - 0,427 г.

Сульф 480 в 1 таблетке содержит в качестве действующих веществ сульфадиазин - 0,4 г и триметоприм - 0,08 г, а также вспомогательные вещества: крахмал картофельный - 0,037 г, кальция стеарат - 0,003 г и лактозу - 0,08 г.

По внешнему виду Сульф 480 и Сульф 120 представляют собой плоские таблетки от белого до серого цвета с риской и логотипом в форме щита с нанесенным внутри него крестом.

3. Выпускают препарат расфасованным по 6 таблеток в блистерах, упакованных по одному в картонные пачки; по 70 и 100 таблеток в полимерных банках.

4. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 0 °С до 25 °С.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения - 3 года с даты производства. Запрещается применение Сульф 120 и Сульф 480 по истечении срока годности.

5. Сульф 120 и Сульф 480 следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Сульф 120 и Сульф 480 относятся к группе комбинированных антибактериальных препаратов.

Механизм действия комбинации триметоприма и сульфадиазина, входящих в состав препарата, заключается в последовательном блокировании синтеза фолиевой кислоты в микробной клетке: сульфадиазин нарушает синтез дигидрофолиевой

кислоты, а триметоприм препятствует превращению дигидрофолиевой кислоты в тетрагидрофолиевую.

Препарат активен против грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе *E.coli*, *Clostridium* spp., *Salmonella* spp., *Proteus* spp., *Bacillus anthracis*, *Pasteurella* spp., *Haemophilus* spp., *Vibrio* spp., *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Shigella* spp., *Corynebacterium* spp., *Klebsiella* spp., *Fusobacterium* spp. и *Bordetella* spp.

При пероральном применении препарата его активные компоненты хорошо всасываются в желудочно-кишечном тракте и проникают в большинство органов и тканей организма животного, достигая максимальных концентраций в сыворотке крови через 3-4 часа, и удерживаются на терапевтическом уровне не менее 12 часов; выводятся из организма в основном с мочой, у лактирующих животных - частично с молоком.

Сульф 120 и Сульф 480 по степени воздействия на организм относятся к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

8. Сульф 120 и Сульф 480 назначают молодняку крупного и мелкого рогатого скота, жеребят, свиньям, собакам, кошкам и пушным зверям с лечебной целью при бактериальных инфекциях органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, кожи, пастереллеза, сальмонеллеза и других заболеваний, возбудители которых чувствительны к триметоприму и сульфадиазину.

9. Противопоказанием к применению Сульф 120 и Сульф 480 является индивидуальная повышенная чувствительность животного к сульфаниламидам и триметоприму, нарушения функций органов кроветворения, печени и почек.

Не следует применять препарат беременным и лактирующим животным.

10. Препарат применяют животным перорально в следующих суточных дозах:

Сульф 120 – 1 таблетка на 4 кг массы животного;

Сульф 480 – 1 таблетка на 16 кг массы животного.

Суточную дозу препарата задают животным в два приема с интервалом 12 часов. Лечение проводят в течение 5-7 дней.

11. При передозировке или превышении продолжительности рекомендуемого курса лечения, возможны нарушения деятельности почек и желудочно-кишечного тракта (дисбактериоз). В этом случае необходимо прекратить применение препарата и назначить симптоматическое лечение (щелочные жидкости, витамины и пробиотики).

12. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

13. Следует избегать нарушений рекомендуемой схемы применения препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска очередного применения препарат необходимо ввести как можно скорее в терапевтической дозе, далее интервал между введениями препарата не изменяется.

14. Побочных явлений и осложнений при применении Сульф 120 и Сульф 480 в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата и появлении аллергических реакций его использование прекращают.

15. Не следует применять Сульф 120 и Сульф 480 одновременно с препаратами

п-аминобензойной кислоты (новокаином, прокаином, анестезином, бензокаином).

16. Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 9 суток после последнего применения лекарственного препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано в корм плотоядным животным.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с Сульф 120 и Сульф 480 следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством воды. Люди с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Сульф 120 и Сульф 480. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: ООО “НВЦ Агроветзащита С-П.”, 141300, Россия, Московская область, г. Сергиев Посад, Центральная ул., 1. Адрес места производства: ООО “НВЦ Агроветзащита С-П.”, 141300, Россия, Московская область, г. Сергиев Посад, Центральная ул., 1.

С утверждением настоящей инструкции считать утратившей силу инструкцию по применению Сульф таблеток, утвержденную Россельхознадзором 27 января 2011 года.

Инструкция разработана ООО “Научно-внедренческий центр Агроветзащита”; 129329, г. Москва, Кольская ул., 1 стр.1.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ “ВГНКИ”.